

Una enfermedad evitable

Diarrea por Rotavirus en el niño pequeño



Dra. Stella Gutiérrez



La gastroenteritis por Rotavirus es la causa principal de internación por diarrea en bebés y niños pequeños entre 6 meses y 2 años. Causa también brotes de diarrea en guarderías y en salas de internación.

Produce vómitos y diarrea con frecuente deshidratación. La enfermedad dura entre 5 a 7 días.

Desde hace algunos años, Uruguay cuenta con dos vacunas para evitar esta enfermedad que lamentablemente deben abonarse ya que no forman parte aún de las vacunas gratuitas que otorga el Ministerio de Salud Pública.

Ambas se administran por boca y su gran ventaja es que también ambas evitan la hospitalización de los niños por enfermedad grave.

Se administran a partir de los 2 meses de vida con límite máximo de 3 meses y medio para comenzar el plan de vacunación. Más adelante, ya no se recomiendan.

El intervalo para recibir la 2ª dosis es de 4 semanas y se puede administrar separada o junto al resto de las vacunas del esquema.

Los bebés prematuros pueden vacunarse a partir de las 6 semanas de edad posnatal.

Los bebés amamantados la reciben con el mismo calendario que los no amamantados.

El CASMU cuenta en el Policlínico con Rotarix que se administra a los 2 y 4 meses de vida. Su costo aproximado es de \$1340 por dosis.