



PREPARACIÓN SULFODOM

(SULFATO DE SODIO, POTASIO Y MAGNESIO)

No indicada en pacientes con insuficiencia renal severa (creatinina mayor de 1,2 mg/dl)

Endoscopia coordinada para la mañana

DIETA

- Siete días previos al día del estudio: NO ingiera alimentos con semillas o granos (Ej.: galletitas o panes con semillas o integrales) o frutos secos (Ej.: nueces, maní, almendras).
- Tres días previos: NO consuma frutas ni verduras. Consuma 2-3 litros de los líquidos claros (agua, aguas saborizadas sin gas, té, jugos colados, caldos colados).
- Día previo:
 - Desayuno: té, jugos colados. Pan sin semilla o galletitas al agua.
 - Almuerzo: pasta seca con aceite (sin queso), arroz blanco (no integral) bien cocido o papa cocida sin cáscara, pollo o pescado al horno o a la plancha, caldos colados. y gelatinas no rojas y helado de agua no rojo.
 - Por la tarde y noche: continúe con la ingesta de los líquidos claros exclusivamente y en cantidad abundante y gelatinas no rojas. No consuma alimentos sólidos.
 - No tomar mate.

LAXANTES

• DÍA PREVIO:

HORA **14:00** - ingiera 2 comp. de Bisacodilo con líquidos claros

HORA **15:00**- diluir 1 frasco de Sulfodom dentro del vaso suministrado, completando con agua hasta la linea marcada en dicho vaso (480 ml), mezclar bien y beber todo.

Durante la hora siguiente tomar 1 litro más de agua

HORA **21:00** - ingiera 2 comp. de Bisacodilo con líquidos claros.

• DÍA DEL ESTUDIO:

HORA **02:00** - diluir 1 frasco de Sulfodom dentro del vaso suministrado, completando con agua hasta la linea marcada en dicho vaso (480 ml), mezclar bien y beber todo.

Ingiera 2 comp. de Bisacodilo con líquidos claros. Durante la hora siguiente tomar 1 litro más de agua.

*Se recomienda tomar abundantes líquidos claros entre las tomas de laxante.

Debe finalizar la ingesta de líquidos claros en las 2 horas previas al estudio.

Si luego de leer las instrucciones le han quedado dudas sobre como tomar la preparación o medicamentos, puede consultar al 2487 5333 interno 2497 o escribirnos al correo caendig@casmu.com, o de manera presencial en el consultorio 206 del Policlínico Central 8 de Octubre 3310, en el horario de 8:00 a 20:00 hs de lunes a viernes.

Su examen ha sido marcado para ser realizado el
día: _____ a la hora: _____

Usted debe presentarse en el Policlínico CASMU de 8 de Octubre 3310 - 2° piso en el sector de Endoscopia, consultorios 209-210.

DEBERÁ CONCURRIR:

- Acompañado de alguien responsable mayor de edad (si se realiza bajo sedación).
- Tener consentimientos, leídos y firmados.
- Orden de solicitud y estudios previos si los tuviera.



PREPARACIÓN SULFODOM

(SULFATO DE SODIO, POTASIO Y MAGNESIO)

No indicada en pacientes con insuficiencia renal severa (creatinina mayor de 1,2 mg/dl)

Endoscopia coordinada para la tarde

DIETA

- Siete días previos al día del estudio: NO ingiera alimentos con semillas o granos (Ej.: galletitas o panes con semillas o integrales) o frutos secos (Ej.: nueces, maní, almendras).
- Tres días previos: NO consuma frutas ni verduras. Consuma 2-3 litros de los líquidos claros (agua, aguas saborizadas sin gas, té, jugos colados, caldos colados).
- Día previo:
 - Desayuno: té, jugos colados. Pan sin semilla o galletitas al agua.
 - Almuerzo: pasta seca con aceite (sin queso), arroz blanco (no integral) bien cocido o papa cocida sin cáscara, pollo o pescado al horno o a la plancha, caldos colados. y gelatinas no rojas y helado de agua no rojo.
 - Merienda (hora 17:00): té, jugos colados. Pan sin semillas o galletitas al agua.
 - Por la noche: continúe con la ingesta de los líquidos permitidos exclusivamente y en cantidad abundante. No consuma alimentos sólidos.
 - No tomar mate.

LAXANTES

- DÍA PREVIO:

HORA **20:00** - ingiera 2 comp. de Bisacodilo con líquidos claros

HORA **21:00**- diluir 1 frasco de Sulfodom dentro del vaso suministrado, completando con agua hasta la linea marcada en dicho vaso (480 ml), mezclar bien y beber todo.

Durante la hora siguiente tomar 1 litro más de agua

- DÍA DEL ESTUDIO:

HORA **05:00** - ingiera 2 comp. de Bisacodilo con líquidos claros.

HORA **08:00** - diluir 1 frasco de Sulfodom dentro del vaso suministrado, completando con agua hasta la linea marcada en dicho vaso (480 ml), mezclar bien y beber todo.

Ingiera 2 comp. de Bisacodilo con líquidos claros. Durante la hora siguiente tomar 1 litro más de agua.

*Se recomienda tomar abundantes líquidos claros entre las tomas de laxante.

Debe finalizar la ingesta de líquidos claros en las 2 horas previas al estudio.

Si luego de leer las instrucciones le han quedado dudas sobre como tomar la preparación o medicamentos, puede consultar al 2487 5333 interno 2497 o escribirnos al correo caendig@casmu.com, o de manera presencial en el consultorio 206 del Policlínico Central 8 de Octubre 3310, en el horario de 8:00 a 20:00 hs de lunes a viernes.

Su examen ha sido marcado para ser realizado el
día: _____ a la hora: _____

Usted debe presentarse en el Policlínico CASMU de 8 de Octubre 3310 - 2° piso en el sector de Endoscopia, consultorios 209-210.

DEBERÁ CONCURRIR:

- Acompañado de alguien responsable mayor de edad (si se realiza bajo sedación).
- Tener consentimientos, leídos y firmados.
- Orden de solicitud y estudios previos si los tuviera.